

Together we can go far

www.afriausileac.org

مشاوره بهداشتی درباره واکسیناسیون برای (Persian)

سفر

وضعيت: فعال

ناریخ صدور: ۲۱ مه ۱۰۱۲ ا ا ک

صادر شده توسط: دکتر کلر لوکر، رئیس بهداشت صادر شده به: جامعه ویکتوریایی و حرفهایهای بهداشت یامهای کلیدی ویکتوریاییهایی که برنامهریزی برای سفر به خارج دارند باید اطمینان حاصل کنند که واکسیناسیونهای معمولی آنها بهروز است. این شامل واکسیناسیون علیه بیماریهایی است که ممکن است در کشورهای مقصد بیشتر شایع باشند

یا متخصص (GP) مسافران باید ۶-۸ هفته قبل از سفر با یک پزشک عمومی بهداشت سفر مشورت کنند تا واکسنهای لازم را تعیین کنند. این شامل افرادی است که به دیدار دوستان و خانواده میروند یا افرادی که به کشور محل تولد خود سفر میکنند

عفونتهای سرخک که در سفرهای بینالمللی کسب میشوند، منبع قابل توجهی از موارد سرخک در استرالیا هستند

نمه مسافران باید اطمینان حاصل کنند که دو دوز واکسن سرخک را دریافت .کردهاند. هر سفر بینالمللی شما را در معرض خطر ابتلا به سرخک قرار میدهد

نیمور-لسته قبلاً به عنوان عاری از هاری در نظر گرفته میشد، اما شیوع هاری در استان همسایه اندونزی، تیمور غربی، اکنون به تیمور-لسته گسترش یافته است.

مسافرانی که به کشورهایی با هاری، از جمله تیمور-لسته، سفر میکنند باید برای واکسن هاری ارزیابی شوند

بر مسافری که پس از بازگشت به خانه دچار بیماری میشود (مانند تب، راش جدید یا اسهال) باید به دنبال مشاوره پزشکی باشد

برای جزئیات بیشتر، اینجا را بخوانید: <u>Health Advice on Immunisations fo</u> Travel

CONTACT US: INFO@AFRIAUSILEAC.ORG











AfriAus ileac

HEALTH ADVICE ON IMMUNISATIONS FOR TRAVEL

Status: Active

Date issued: 31 May 2024

Issued by: Dr Clare Looker, Chief Health Officer

Issued to: Victorian community and health professionals

Key messages

Victorians planning overseas travel should ensure their routine vaccinations are up to date. This includes vaccination against vaccine-preventable diseases that may be more common in the countries that they are visiting.

Travellers should seek advice from a General Practitioner (GP) or a travel health professional 6-8 weeks before travelling to determine which vaccinations are needed. This includes anyone travelling to visit friends and family, or people travelling to their country of birth.

Measles infections acquired during international travel are a significant source of measles cases in Australia.

Travellers should all ensure they have received two doses of measles-containing vaccine. Any international travel puts you at risk of getting measles.

Timor-Leste had previously been considered rabies-free, however an outbreak of rabies in the neighbouring Indonesian province of West Timor has now spread to Timor-Leste.

Travellers to countries with rabies, including Timor-Leste, should be assessed for rabies vaccination.

Any returned traveller who develops illness after returning home (such as a fever, new rash or diarrhoea) should seek medical advice.

For further details, read on: <u>Health Advice on Immunisations for</u> Travel





